



AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO PACIENTE E DA NECESSIDADE DE INGESTÃO DE MEDICAMENTOS APÓS CIRURGIA DE FRENECTOMIA A LASER

Jeova Mateus dos Santos Azevedo ¹, João Nilton Lopes de Sousa ²

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção do paciente e a necessidade de ingestão de analgésicos e anti-inflamatórios no pós-operatório de frenectomia realizada com laser de diodo de alta potência. Vinte indivíduos, de idade entre 12 e 24 anos, com inserção anormal do freio labial superior serão submetidos a cirurgia de frenectomia com laser de diodo com potência de 2,5 W, modo contínuo, sob irrigação suave, utilizando uma fibra ótica com diâmetro de 600 µm. O local da ferida será deixado para cicatrização secundária sem qualquer sutura. Quaisquer aderências ao periosteio também serão removidas por irradiação a laser. Nos casos em que o freio labial superior for classificado com inserção interpapilar, a papila interdental será removida. Não serão realizadas suturas. Os pacientes serão instruídos a manter uma boa higiene bucal durante todo o período pós-operatório e os parâmetros clínicos de desconforto/limitações funcionais pós-operatórias e ingestão de analgésicos/antiinflamatório serão avaliados após 5 horas e diariamente até o 7º dia após a cirurgia com auxílio de uma escala analógica visual (VAS).

Palavras-chave: Labial frenum. Frenectomy. Diode laser

¹ Aluno do curso de Odontologia, Departamento de <Nome do Departamento>, UFPG, Campina Grande, PB, e-mail: emaildoaluno@seuprovedor.com

² <Titulação>, <Função>, <Departamento>, UFPG, Campina Grande, PB, e-mail: emaildoorientador@seuprovedor.com