



**PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PESSOAS ESTOMIZADAS EM
MUNICÍPIOS DO CURIMATAÚ PARAIBANO.**

Ana Esther Guedes Sodré ¹, Alana Tamar Oliveira de Sousa ²

RESUMO

Objetivo: apresentar o perfil epidemiológico e clínico de pessoas com estomas nos municípios de Cuité e Barra de Santa Rosa, cidades que fazem parte do Curimataú Paraibano. **Método:** Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, do tipo transversal, com abordagem quantitativa, realizada com pessoas estomizadas, que eram usuárias do serviço de atenção primária dos municípios de Barra de Santa Rosa e Cuité. Foram incluídas pessoas maiores de 18 anos, que tivessem qualquer tipo de estoma, de forma temporária ou definitiva. A coleta de dados foi guiada por um roteiro estruturado, contendo os itens relacionados aos dados sociodemográficos, clínicos e terapêuticos dos participantes. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa sob o CAAE nº 71368123.8.0000.0154.

Resultados: Participaram do estudo seis pessoas estomizadas, sendo cinco homens e uma mulher. Todos possuíam baixa escolaridade e baixa renda mensal. Quatro eram residentes de Cuité, e cinco residiam na zona urbana. Cinco eram casados, e quatro relataram independência nas atividades de vida diária. As comorbidades mais frequentes foram a hipertensão arterial, ansiedade e depressão. A colostomia foi o estoma mais comum, bem como a bolsa coletora de colostomia. A obstrução foi a causa mais frequente para a realização do estoma, e o prurido foi a complicação mais citada. O tempo de estoma predominante foi de dois a nove anos.

Conclusões: A realização deste estudo contribuiu para conhecer o perfil de saúde dos estomizados das cidades cenários da pesquisa e pode auxiliar novos trabalhos envolvendo profissionais e esses participantes.

Palavras-chave: Estomas cirúrgicos; Epidemiologia; Colostomia.

¹Graduanda em Enfermagem, Unidade Acadêmica de Enfermagem, UFCG, Cuité, PB, e-mail: ana.esther@estudante.ufcg.edu.br

²Doutora em Enfermagem, Docente da Unidade Acadêmica de Enfermagem, UFCG, Cuité, PB, alana.tamar@professor.ufcg.edu.br



CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PEOPLE WITH OSTOMIES IN MUNICIPALITIES OF CURIMATAÚ PARAIBANO.

ABSTRACT

Objective: to present the epidemiological and clinical profiles of people who live with ostomies in the cities of Cuité and Barra de Santa Rosa, in the Curimataú subregion of the Paraiba state. **Method:** This is a epidemiological research qualified as transversal, with a quantitative approach, which was developed in the First Aid Services of the already mentioned cities. The research included people with the age of 18 years old who lived with any kind of ostomy, whether temporarily or permanently. The collection of the data followed a structured itinerary consisting of topics such as sociodemographic, clinical and therapeutic data of the individual who took part of this investigation. The research was approved by the Committee of Ethics under CAAE at 71368123.8.0000.0154. **Results:** Six people with different types of stomatitis took part in this research, where five of them were men and one woman. All of them were part of low-income families with a low schooling background. Four of them were from Cuité city while two of them lived in Barra de Santa Rosa and among the six of them, only two lived in the urban area. Five were married and four of them declared themselves as self-employed person. The most frequent comorbidities observed among the participants were arterial hypertension, anxiety and depression, with the colostomy being observed as the most common stoma among them, as well as the colostomy bag. Obstruction was the most frequent cause of the ostomy, and itching was the most frequently cited complication. The predominant ostomy time was two to nine years. **Conclusions:** The present study contributed to knowledge of the health profile of the stomized cities scenarios of the research and may help in the development of new works involving professionals and those participants.

Keywords: Surgical stomata; Epidemiology; Colostomy.